


« Effets Secondaires »





Laurie-Yanne
est née en
1987





Elle a eu une vie des plus enrichissante



Elle a reçu
beaucoup
d'amour de
sa famille





Elle avait un groupe d'amies



... de bonnes amies d'enfance



Elle était très sportive



...et avait
toujours le
mot pour
faire rire



Je crois
sincèrement
qu'elle a été
heureuse



... et qu'elle
avait tout pour
réussir



« La Cité Secrète des Grands Rêves »

Elle avait une belle vision d'un monde idéal



À l'âge de 15 ans, elle se déchire le ligament croisé antérieur du genou en jouant au soccer

...morphines...



...opioïdes...



...benzodiazépines...

Statex
Vioxx
Diazepam
Amitriptyline

...valium...



À l'hôpital, comme elle ne supporte pas la douleur, on lui prescrit, à mon insu, des antidépresseurs...

...deux mois plus tard,
lorsqu'elle arrête de les
prendre, sa personnalité
change... je ne la reconnais
plus, elle devient maussade,
irritable et impatiente...



...elle commence à s'isoler, et
voit de moins en moins ses
amies, qui probablement
doivent la trouver quelque peu
désagréable et étrange...



Malgré tous ses efforts, et plus le temps passait, plus elle avait de la difficulté à aller vers les autres...
On aurait dit qu'elle avait de plus en plus d'agressivité en dedans...



...un jour, elle
défonce la porte
de sa chambre
avec un bâton de
base-ball et me
frappe en me
donnant des
coups de poings
alors que je lui
demande
simplement de
ranger sa
chambre (...)






Ses nouveaux
dessins reflètent son
état intérieur...






Et son
sentiment
d'isolement...

En mai 2006, je découvre par hasard ce
dessin dans sa chambre ...



...ce fut la suite de ce cauchemar...
dans lequel Laurie-Yanne se retrouvera à
l'hôpital psychiatrique...

...benzodiazépines...



...ISRS...




Ativan
Zyprexa
Celexa
Benztropine
Séroquel
Halopéridol

...neuroleptiques...

...olanzapines...

...et où, pour essayer de l'aider, on
va lui donner un cocktail de
pilules...



...qui va l'amener à passer à l'acte,
le 9 octobre 2006...

J'ai pendant des jours cherché une raison à son suicide, mais aucune ne me semblait valable...

je cherchais à réunir les pièces du casse-tête à travers ses dessins et ses écrits ...

...mais j'avais le sentiment que quelque chose m'échappait, que tout cela était invraisemblable et ne tenait pas debout...

C'est en voyant le reportage à la télévision
« *Tranquillisants : « l'Overdose »* »
et que j'ai commencé à comprendre...

Ce reportage commençait comme suit :

*"Suicide, agressivité, dépendance, passages à l'acte...
les « effets indésirables » se multiplient au point que le
Ministère de la Santé, (en France), reconnaissant
l'existence de risques suicidaires, envisage l'interdiction
de prescrire des antidépresseurs aux mineurs »*

J'ai ensuite découvert qu'une mise en garde de **Santé-Canada** a été émise le 26 mai 2004, concernant CELEXA, un antidépresseur qui a été prescrit à Laurie-Yanne.

Voici un extrait de cet avis :

« *Des analyses récentes de bases de données d'essais cliniques laissent supposer que l'utilisation de ces médicaments chez des patients de moins de 18 ans pourrait être associée à des changements comportementaux et émotionnels et peut-être même comporter un **RISQUE ACCRU D'IDÉES ET DE COMPORTEMENTS SUICIDAIRES** par rapport à un placebo. »*

« ...on a signalé des effets indésirables sévères de type agitation couplés à des actes d' **AUTOMUTILATION** ou à des **COMPORTEMENTS AGRESSIFS À L'ÉGARD D'AUTRUI...**

Ces effets indésirables sont les suivants :
**AGITATION, HOSTILITÉ, AGRESSIVITÉ,
DÉPERSONNALISATION, DÉHINHIBITION, LABILITÉ
ÉMOTIONNELLE... »**

*Ces effets secondaires sont indiqués par les
compagnies pharmaceutiques elles-mêmes (...)*

*C'est tellement inimaginable qu'on a
de la peine à le croire ...*

En 2004, la FDA obligeait les fabricants d'antidépresseurs à informer les consommateurs que « ces médicaments peuvent causer des pensées et des actions suicidaires chez les enfants et les adolescents »

En 2005, elle ajoutait qu'il y a « un risque accru de comportement suicidaire chez les adultes prenant des antidépresseurs »

Les preuves s'accumulent que ces soi-disant médicaments sont à l'origine de milliers de cas de suicides et de violence, dont les tueries dans les écoles ...

...qu'ils peuvent provoquer des réactions psychotiques et déclencher des idées suicidaires chez des sujets sans antécédent psychotique .

*Malgré cela, les médecins continuent
d'en prescrire à tours de bras...*

*Combien de suicides et de vies brisées
va t'il falloir avant que ne soient prises les
mesures qui s'imposent ?*