

Complications

Les complications de cette maladie sont communes à d'autres formes de démence;

- Le risque d'infection d'une personne atteinte de démence vasculaire augmente.
- La capacité d'effectuer des tâches quotidiennes devient limitée.
- La capacité d'interagir avec les autres dégrade
- L'espérance de vie est plus courte
- Il peut avoir des effets secondaires consécutives des médicaments utilisés pour aider le/la malade.
- Une personne souffrante peut aussi avoir des changements d'humeur et des hallucinations.
- Une personne atteinte de démence vasculaire aura plus de difficultés pour parler mais sa mémoire sera pas autant affectée.

Diagnostic

Comme la démence vasculaire peut être inaperçue, les spécialistes recommandent une analyse cérébrale pour tout individu considéré d'avoir un risque élevé. Ceci inclut les personnes qui ont déjà eu un accident vasculaire cérébral ou un accident ischémique transitoire.

Les personnes ayant une pression sanguine élevée, un cholestérol élevé ou possédant des facteurs de risques de maladies cardiaques ou vasculaires sont aussi considérées comme ayant un risque élevé.

Traitement

Actuellement, il n'y a pas de médicaments qui peuvent guérir ou prévenir la démence vasculaire, mais l'utilisation de certains médicaments peut ralentir le développement de la maladie.

Pour réduire les risques du développement de la démence vasculaire, il ne faut pas fumer, manger sainement et équilibré, ne pas trop boire, maintenir un poids sain, contrôler la pression sanguine et le niveau de cholestérol.

Impacts sur les proches

Comme dans toutes les maladies qui atteignent la mémoire, la personne souffrante risque de ne plus se souvenir de ses proches.

"S'il y a néanmoins un conseil à suivre, le voici : traitez une personne atteinte de démence comme une personne à part entière. Ne lui parlez jamais comme à un enfant, essayez toujours de l'impliquer dans une conversation et ne l'ignorez pas. N'assimilez pas une personne atteinte de démence à la maladie et surtout, n'oubliez pas qui était cette personne avant."

-<http://www.mloz.be/files/demencefr.pdf>

Cette maladie peut indirectement causer la perte des rôles sociaux et des relations sociales ainsi que la capacité d'effectuer des activités. Ceci peut avoir un grand effet sur la santé de la personne s'occupant du malade (trop de stress, trop de responsabilités, moins de temps pour s'occuper de soi-même).

Démence vasculaire

C'est une détérioration des capacités cognitives et de la mémoire consécutives d'un ensemble des maladies du cerveau non dégénératives.

Les démences vasculaires sont causées par un colmatage des vaisseaux sanguins cérébraux.



Sources:

<http://www.webmd.com/stroke/guide/vascular-dementia>
<http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vascular-dementia/basics/definition/con-20029330>
<http://www.healthline.com/health/dementia/vascular-dementia>
<http://www.mloz.be/files/demencefr.pdf>
<http://sante.lefigaro.fr/sante/seniors/demences-vasculaires/quelles-sont-manifestations-d-une-demence-vasculaire>

Description

Cette maladie est causée par une réduction du flux de sang vers le cerveau. Cela endommage et tue éventuellement les cellules du cerveau.


Symptômes:

Les symptômes de cette maladie peuvent varier est sont le plus “clairs” suite à un accident vasculaire cérébral. La perte de mémoire n'est pas un symptôme pertinent.

Les symptômes de cette maladie sont entre autres:

- Confusion
- Incapacité d'organiser ses pensées
- Problèmes de mémoire
- Dépression
- Déclinaison de la capacité d'analyser une situation, développer un plan

Les premiers symptômes de cette maladie varient dépendant de l'endroit n'ayant pas assez de sang.



Prévalence et/ou épidémiologie

Cette condition touche rarement les personnes âgées de moins de 65 ans. Elle touche les femmes (61%) et les hommes (39%). Cette différence est principalement due au fait que les femmes vivent généralement plus longtemps que les hommes.

En 2013, 1,73% de la population Suisse était atteinte de démence. Ça signifie que environ 0.29% des personnes étaient atteintes de démence vasculaire (qui représente 17% de toutes les démences).

Aux Etats-Unis et en Europe, c'est la deuxième forme la plus commune de démence. Dans certaines parties de l'Asie, c'est la forme la plus commune.


Environ 0.85% à 1.19% de la population mondiale est atteinte de démence vasculaire en 2012.

Causes et facteurs de risque

On peut être atteint de cette maladie suite à un accident vasculaire cérébral ou à plusieurs petits de ce dernier et à un rétrécissement des vaisseaux sanguins dans le cerveau.

La démence vasculaire n'est pas une maladie infectieuse, et généralement, elle n'est pas héréditaire. Les recherches ont montrées que cette maladie est souvent causée par une mutation de quelques gènes-uniques. Les facteurs de risque de cette maladie sont: fumer, un niveau anormal du pression du sang, cholestérol élevé, trop de sucre dans le sang, une alimentation déséquilibrée ou malsaine, un poids malsain, une consommation trop élevée d'alcool.

Phases d'évolution



La démence vasculaire évolue généralement en étapes avec un moment plus ou moins long entre le changement des symptômes, mais cela ne peut pas être prédit.

La première étape de la démence vasculaire s'intitule la “déficiência vasculaire cognitive”. Cette étape est rarement remarquée ou peut être confondue avec d'autres maladies.

Quelques symptômes de cela sont; le ralentissement de la réflexion, la difficulté de planification, les troubles de langage et les problèmes d'attention.

Cependant, si cette maladie est laissée non traitée, l'endommagement du cerveau continue et les symptômes s'aggravent rapidement, ce qui mène à une étape avancée de cette démence rendant les activités quotidiennes difficiles.