

FRAMBOISIER



Comme tous les arbustes à fruits rouges (groseilles, groseilles à maquereau, cassis), le framboisier se développe ici à merveille.

VARIETES :

Il y a deux sortes principales : le framboisier issu de sauvage, qui donne ses fruits en juillet sur les rameaux poussés l'année précédente ; et l'espèce civilisée, un peu plus tardive, un peu moins savoureuse aussi, pour les fruits, et dont les fruits poussent sur des rameaux de l'année.

Précisons que l'espèce « sauvage » ne perd rien en saveur, au contraire, à être cultivée en potager.

Dans l'une comme l'autre des catégories, il y a plusieurs variétés, qui peuvent pousser côte à côte sans inconvénient.

SOL :

Le framboisier apprécie des terrains frais, bien arrosés en particulier l'hiver, riches en humus, et bien acides. Il s'accommode sans difficulté d'une certaine pente. C'est une plante des bordures, et qui apprécie un certain ensoleillement un peu filtré par des feuillages. L'ombre totale lui est fatale. C'est, surtout, une plante qui aime choisir elle-même sa propre implantation, qui a tendance à se déplacer vers des environnements un peu dégagés, et aussi à devenir rapidement envahissante, d'autant qu'elle étouffe les plantes qui tenteraient de se développer dans son voisinage. Le plus simple est de lui laisser les premières années choisir lui-même son emplacement : il se dirigera spontanément, à partir du lieu où on aura fait la

plantation, vers l'environnement qui lui convient. Une fois ce choix effectué, il suffit de le maintenir dessus, de contenir sa tendance invasive, en supprimant les rejets venus ailleurs.

Les framboisiers sont très appréciés des abeilles à la floraison.

MULTIPLICATION :

On multiplie les framboisiers en replantant, à l'automne ou au début du printemps, avant que sa végétation ne redémarre, des « drageons » prélevés à l'automne, ou même en début de printemps, sur des pieds existants. Les drageons sont des rameaux qui se seront développés au voisinage des pieds existants à partir des mêmes rhizomes. On détache avec le drageon un petit morceau de ce rhizome.

Pour la plantation : on plante les drageons, dont on aura supprimé l'extrémité, à 1 mètre en tous sens dans des trous creusés bien vastes remplis de terreau, en tassant modérément et en arrosant bien pendant la reprise, les premiers jours. Immédiatement après la plantation, il est bon de recouvrir le sol de feuilles mortes, branchettes coupées fin ou/et herbe fraîche, surtout des orties.

Le framboisier apprécie aussi des arrosages au purin d'ortie.

Il est inutile de planter des framboisiers en quantité, il ne se multipliera que trop bien de lui-même.

ENTRETIEN :

Pour la taille de plantation, destinée à la formation du pied en touffe, on coupe à l'automne au ras du sol le rejet le plus ancien, le rameau qu'on a planté, et à 60 à 80 cm les extrémités des rejets qui auront poussé.

Les travaux de taille d'entretien sont différents selon qu'on a affaire à des framboisiers « sauvages », et à des « civilisés ». Pour le framboisier sauvage, qui fait ses fruits sur les rameaux poussés l'année précédente, le plus simple est de tailler immédiatement après la récolte, ou en même temps. Le rameau à supprimer se reconnaît à la couleur argentée qu'il a prise. On veille à préserver les rameaux verts, ce sont ceux qui fructifieront l'année suivante. On peut toutefois tailler ceux-ci à 80 cm de hauteur, et ne conserver que six à huit rameaux par pied. On en profite pour désherber, on ré étend une couche protectrice, qu'on renouvellera un peu avant l'hiver. Pour la protection d'hiver, on lui adjoindra un apport de fumier bien décomposé., et un peu de cendre de bois. On peut refaire un apport de compost et de cendre au démarrage de la végétation, au printemps.

La taille annuelle est importante, sinon le framboisier s'étouffe dans ses rameaux morts et dans les ronces qui se développent autour.

Pour les framboisiers de l'espèce civilisée, qui fructifient sur des rameaux de l'année : on supprime en fin d'été, après la fin de la fructification, qui est beaucoup plus étalée que pour l'espèce sauvage, les bois de deux ans et la partie de rameau de l'année qui a fructifié. Les travaux d'entretien du sol sont les mêmes que pour les framboisiers sauvages.

DUREE DE CULTURE :

On peut espérer quelques framboises dès l'année suivant la plantation, mais la véritable fructification demande d'attendre trois ans.

CULTURES ASSOCIEES :

Toute culture entre les pieds des framboisiers est difficile, le feuillage est trop opaque, et les racines occupent trop le sol. Par contre, certains voisinages semblent réussir particulièrement, en particulier pommes de terre ou tomates.

RENDEMENT :

Il y a de grosses variations de production selon les années. On peut compter sur 35 kg de framboises en moyenne pour 100 m² de framboisiers, et parfois davantage.

ROTATION :

Si l'on veille à ce qu'ils ne s'auto-étouffent pas, et qu'on enrichit convenablement le sol, on peut laisser les framboisiers en place pendant 30 à 40 ans.



Fleur



fruits