

Louis-Pierre Fournier
Avril 2008
PS - G

ÉVALUATION CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE

4 étapes

- Approche de la situation
- Évaluation primaire
- Évaluation secondaire
- Traitements

Approche de la situation

- ⊙ Danger pour sauveteur, victime ou témoins
- ⊙ Gants, masque de poche
- ⊙ Présentation du sauveteur (nom, fonction, consentement de la victime)

Évaluation primaire

- ⊙ L : -L'état de conscience
- ⊙ ' : -Demandez de l'aide
 - Appellez 9-1-1
 - Demandez un DEA
- ⊙ A : Airways
- ⊙ B : Breathing
- ⊙ C : Compressions


	Inconscient	Conscient
L	- État de conscience (stimuli auditif et physique)	- État de conscience
'	- SPU - DEA - Aide	- SPU - DEA - Aide
A	- Déf. : Airways - But : Ouverture des voies respiratoires - Regarder dans la bouche - RTSM (Renversement de la tête, soulèvement du menton) - Traction mandibulaire si cas de colonne	- Déf. : Airways - But : Maintient des voies respiratoires dégagées - Relevez votre menton - Dégagez vos épaules
B	- Déf. : Breathing - But : Évaluation de la respiration - RES (Regarder-Écouter-Sentir) entre 5 et 10 sec. - Pas de respiration → donner deux insufflations - Si elles ne passent pas → DVR	- Déf. : Breathing - But : Évaluation de la respiration - Prenez 2 grandes respirations - Est-ce que ça vous fait mal? - Avez-vous de la difficulté à respirer?
C	- Déf. : Circulation - Installer le DEA* - Hémorragie majeure - Si absence de respiration en B → 5 cycles de RCR	- Déf. : Circulation - Hémorragie majeure

Évaluation secondaire

- Examen de la tête aux pieds :
 - Position trouvée
 - De la tête aux pieds finissant par les bras
 - Du bas vers le haut (plus proche du sol en premier)
 - Blessure → exposer, stabiliser
- Signes vitaux (qualité, quantité) :
 - Niveau de conscience (lieu, temps, événement) (AVPU)
 - Respiration (15 secondes) (fréquence, rythme, amplitude)
 - Pouls (15 secondes) (fréquence, rythme, force)
 - Peau (coloration, texture, température)
 - Pupille (grandeur, réaction à la lumière, forme)

Évaluation secondaire

Histoire de cas	
S	Signe et symptômes
A	Allergies
M	Médicaments
P	Passé médical
L	Lunch
E	Événement provocateur



Traitements

- ◎ Traitements spécifiques :
 - Traitement en priorité une fois les blessures exposées et stabilisées
- ◎ Traitements continus :
Tout au long de la prise en charge
 - **C** : Couverture
 - **O** : Oxygène
 - **R** : Réconfort
 - **P** : Position confortable
 - **S** : Surveiller les signes vitaux